

- 우리나라 보건소에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 보건소 설치의 목적은 국민에게 건강에 대한 가치와 책임 의식을 함양하도록 건강에 관한 바른 지식을 보급하고 스스로 건강생활을 실천할 수 있는 여건을 조성함으로써 국민의 건강을 증진함을 목적으로 하고 있다.
 ② 우리나라 최초의 보건소는 경성보건소로 1925년 설치되었으나, 일본의 형식적인 공공보건정책으로 유명무실하게 운영되었다.
 ③ 보건소법은 1956년 처음으로 제정되었으며, 이후 인구 구조 및 질병구조의 변화, 국민소득 수준의 향상 등으로 기능을 강화해야 할 필요성이 커지면서 1991년 지역보건법으로 전면 개편되었다.
 ④ 1977년 의료보호제도가 실시되면서 보건소는 일차보건 의료기관으로 지정되어 의료보호(현 의료급여) 대상자들에게 의료사업을 제공하기 시작하였다.
- 보건복지부는 2015년 국민의 건강한 삶을 보장하기 위한 의료비 부담경감 방안으로 4대 중증질환 환자부담 감소를 위한 급여항목을 추가하였다. 해당 질환이 아닌 것은?
 ① 암
 ② 치매
 ③ 심장질환
 ④ 뇌혈관질환
- 2013년부터 전국 지자체에서 시행되고 있는 지역사회 통합 건강증진사업의 기본방향 중 옳지 않은 것은?
 ① 분절적인 단위사업 중심에서 대상자 중심의 통합서비스 제공(효율성)
 ② 정해진 지침에 따른 운영에서 지역 여건에 맞추어 탄력적인 운영(자율성)
 ③ 생애주기별, 공통적 건강문제를 갖는 인구 집단별 모든 주민의 건강관리사업(형평성)
 ④ 정해진 사업의 물량 관리위주의 평가에서 사업 목적·목표 달성 여부의 책임 평가(책임성)
- 보건소 방문간호요원이 가정방문을 하려고 한다. 이때 적용할 가족사정도구 중 사회지지도(sociosupportgram)에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 가족 내 가장 취약한 가구원을 중심으로 가족 내부뿐만 아니라 외부와의 상호작용을 보여준다.
 ② 가족구성원들이 상호작용하는 외부환경들을 명료하게 해주며, 가족에게 유용한 자원과 스트레스가 되는 자원, 부족한 자원과 보충해야 할 자원 등에 관한 정보를 제공해준다.
 ③ 가족구성원 중 향후 질병을 앓을 가능성과 지역사회 및 임상에서 복합적인 스트레스를 경험하는 개인을 미리 파악하는 데 유용하다.
 ④ 현재 동거하고 있는 가족구성원들 간의 밀착관계와 상호관계를 파악하는 데 도움이 된다.
- 캐나다의 보건성 장관이었던 Lalonde의 보고서(1974)에서는 건강에 결정을 미치는 주요 요인을 제시하였다. 건강 결정요인으로 가장 옳지 않은 것은?
 ① 생물학적 요인
 ② 생활습관
 ③ 교육정도
 ④ 보건의료조직

- 지역사회간호사가 오렘이론을 적용하여 간호목표를 설정하였다. 옳은 것은?
 ① 가출청소년이 가족과의 원만한 의사소통과 상호작용을 유지한다.
 ② 당뇨병환을 가진 노인이 합병증 예방을 위해 자가간호를 수행한다.
 ③ 치매노인을 둔 가족이 환경 변화 속에서 역동적인 평형상태를 유지한다.
 ④ 재혼가족이 새로운 구성원과 변화된 가족환경에 적응반응을 나타낸다.
- 보건소와 학교가 협력하여 학생 500명을 대상으로 하여 비만 사업을 수행한 결과 총비용이 200만원 소요되었고 비만율이 10% 감소되었다. 비용효과비는?
 ① 400
 ② 500
 ③ 4,000
 ④ 5,000
- 지역사회간호활동단계에서 지역주민참여의 의미를 설명한 것으로 옳지 않은 것은?
 ① 정부정책이나 관련부서의 사업내용을 직접 전달할 수 있으므로 사업진행의 이해도를 높일 수 있다.
 ② 지역사회의 공동 운명체를 강화시켜 다른 개발활동에 참여의욕을 높일 수 있다.
 ③ 보건사업과정 중 예기치 못한 변화가 생길 때 주민의 이해를 얻을 수 있다.
 ④ 보건사업에 대한 지역주민의 전문성을 향상시켜 공공보건 의료의 부담을 경감시킬 수 있다.
- 지역사회 간호과정을 적용하여 대학생들을 대상으로 금연 프로그램을 실시하고자 한다. 다음 중 사정단계에서 이루어진 내용으로 옳은 것은?
 ① 금연전문강사가 대학을 방문하여 개별금연교육을 실시하였다.
 ② 이 지역에 있는 2개 대학의 흡연율을 타 지역과 비교하였다.
 ③ ‘흡연대학생의 30%가 금연에 성공한다.’로 목표를 설정하였다.
 ④ 금연성공률은 6주, 12주, 6개월 후에 평가하기로 하였다.
- 보건소에 근무하는 K공무원은 「지역보건법」에 의거하여 보건의료계획서를 수립하려고 한다. K가 고려해야 할 사항으로 옳은 것은?
 ① 시장·군수·구청장은 당해 시·군·구의 지역보건의료계획 또는 그 연차별 시행계획의 시행결과를 매 시행연도 다음해 2월말까지 보건복지부장관에게 제출하여야 한다.
 ② 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 지역보건의료계획을 수립하는 경우에 그 주요 내용을 1주 이상 공고한 후 공청회를 실시하여 지역주민의 의견을 수렴하여야 한다.
 ③ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 지역보건의료계획을 매 5년마다 수립하여야 한다.
 ④ 지역보건의료계획 및 그 연차별 시행계획의 제출시기는 시장·군수·구청장의 경우에는 계획시행 전년도 6월말까지 해야 한다.

11. 소음이 심한 산업장에서 일하는 근로자가 건강진단 결과 질병유소건자로 발견되어 업무수행 적합여부를 평가한 결과 ‘다’로 판정받았다. 보건관리자가 이 근로자에게 교육한 내용으로 옳은 것은?

- ① 현재의 조건하에서 작업이 가능하며 지속적인 청력검사가 필요함
- ② 귀마개와 귀덮개를 모두 착용한 상태에서 현재의 작업이 가능함
- ③ 근로시간을 50% 단축한 상태에서 현재의 작업이 가능함
- ④ 청력장해가 우려되어 한시적으로 현재의 작업을 할 수 없음

12. 산업장 유해물질 허용기준에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 우리나라 유해물질의 허용기준은 모두 세계표준기준을 채택하고 있다.
- ② 시간가중 평균노출기준(Time Weighted Average ; TWA)은 하루 24시간 중에 실제 수행된 노동시간 중의 평균 농도로 나타낸다.
- ③ 단시간 노출기준(Short Term Exposure Limit ; STEL)은 근로자가 1회에 60분간 유해요인에 노출되는 경우를 기준으로 나타낸다.
- ④ 유해물질을 혼재해서 사용하는 경우 단독 유해물질의 노출기준을 그대로 적용해서는 안된다.

13. 아래와 같은 인구구조를 가진 지역사회가 있다. 이 지역의 노령화 지수는? (단, 단위는 명)

- 0-14세 : 200
- 15-44세 : 700
- 45-64세 : 500
- 65-80세 : 200
- 81세 이상 : 100

- ① 1.5 ② 15
③ 150 ④ 700

14. 실험기구를 생산하는 공장지대 근처에 살고 있는 김씨는 주변 지하수를 식수로 사용하고 있다. 얼마 전부터 김씨는 입안에 출혈이 있고 손 떨림이 심해져 병원을 방문하게 되었다. 김씨에게 의심되는 중독으로 가장 옳은 것은?

- ① 납중독
- ② 수은중독
- ③ 크롬중독
- ④ 카드뮴중독

15. 2015년 6월 현재 우리나라의 중앙재난안전대책 본부장은 누구인가?

- ① 대통령
- ② 국민안전처차관
- ③ 국민안전처장관
- ④ 발생지역의 지자체장

16. 다음은 보건교육방법에 대한 설명이다. 옳은 것을 모두 고르면?

- ㉠ 강의 - 많은 대상자에게 짧은 시간 동안 많은 지식과 정보를 제공한다.
- ㉡ 그룹토의 - 일방식 교육방법으로 참가자가 자유로운 입장에서 상호의견을 교환하고 결론을 내린다.
- ㉢ 분단토의 - 각 견해를 대표하는 토론자 4~5명을 선정하고 사회자의 진행하에 토론한다.
- ㉣ 역할극 - 학습자가 실제 상황 속 인물로 등장하여 그 상황을 분석하고 해결방안을 모색한다.

- ① ㄱ, ㄷ
② ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

17. 지역사회간호사가 Green의 PRECEDE-PROCEED 모형을 이용하여 보건교육을 기획하는 과정에서 다음과 같은 진단을 내렸다면 이는 어느 단계에 해당하는가?

지역사회주민의 고혈압 식이조절에 대한 지식과 신념이 부족하며 의료시설 이용이 부적절하다.

- ① 교육 및 생태학적 진단단계
- ② 사회적 진단단계
- ③ 역학 및 행위와 환경 진단단계
- ④ 행정 및 정책적 진단단계

18. 역학연구방법에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기술역학은 질병과 특정 노출요인에 대한 정보를 특정한 시점 또는 짧은 기간 내에 얻는 방법이다.
- ② 단면조사연구의 주요 변수는 인구학적 특성, 지역적 특성, 시간적 특성이다.
- ③ 후향적 코호트연구는 연구시작 시점 훨씬 이전으로 거슬러 올라가 ‘요인 노출’과 ‘질병 발생’ 간의 관련성을 추적하는 방법이다.
- ④ 이중맹검법(double blind method)은 환자-대조군연구에서 정보편견을 최소화하는 방법이다.

19. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」상 보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 강제처분권을 가지고 감염병이 의심되는 주거시설, 선박, 항공기, 열차 등의 운송수단 또는 그밖의 장소에 들어가 필요한 조사나 진찰을 하게 할 수 있는 감염병에 포함되지 않는 것은?

- ① 제1군감염병
- ② 제2군감염병 중 디프테리아, 홍역 및 폴리오
- ③ 제3군감염병 중 쓰쓰가무시증, 랩토스피라증 및 신증후군성 출혈열
- ④ 생물테러감염병

20. 지역사회간호사가 지역주민 600명을 대상으로 유방암검진을 실시한 결과 다음과 같은 결과를 얻었다면 민감도와 특이도는?

		유방암 있음	유방암 없음	계
유방암 검진	양성	96	2	98
	음성	5	497	502
계		101	499	600

- $$\begin{aligned} \textcircled{1} \text{ 민감도} &= \frac{96}{98}, & \text{특이도} &= \frac{497}{502} \\ \textcircled{2} \text{ 민감도} &= \frac{96}{101}, & \text{특이도} &= \frac{497}{499} \\ \textcircled{3} \text{ 민감도} &= \frac{2}{98}, & \text{특이도} &= \frac{5}{502} \\ \textcircled{4} \text{ 민감도} &= \frac{5}{101}, & \text{특이도} &= \frac{2}{499} \end{aligned}$$