


6. 표는 바닥상태 원자 A ~ C에 대한 자료이다.

원자	A	B	C
p 오비탈에 들어 있는 전자 수	3	5	7

전자가 들어 있는 오비탈 수를 옳게 비교한 것은? (단, A ~ C는 임의의 원소 기호이다.)

- ① A = B = C ② A = B > C ③ B = C > A
 ④ C > A = B ⑤ C > B > A

7. 그림은 HA와 BOH를 각각 물에 녹였을 때, 수용액에 존재하는 이온을 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- < 보 기 > —————
- ㄱ. BOH는 아레니우스 염기이다.
 ㄴ. HA는 물과 반응할 때 브뢴스테드-로우리 산으로 작용한다.
 ㄷ. pH는 BOH(aq)이 HA(aq)보다 크다.
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ


8. 다음은 몇 가지 원자 또는 이온의 구성 입자 수에 대한 자료이다. (가)~(다)는 각각 양성자, 중성자, 전자 중 하나이다.

- $^{23}_{11}\text{Na}$ 에서 (가)와 (나)의 수는 같다.
- $^{18}_8\text{O}^{2-}$ 에서 (가)와 (다)의 수는 같다.
- $^{a}_{16}\text{X}^{2-}$ 에서 (나)와 (다)의 수는 같다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X는 임의의 원소 기호이다.)

- < 보 기 > —————
- ㄱ. (다)는 양성자이다.
 ㄴ. a = 32이다.
 ㄷ. $^{23}_{11}\text{Na}^+$ 에서 (가)의 수는 10이다.
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

9. 그림은 화합물 ABC와 DB의 화학 결합 모형을 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A ~ D는 임의의 원소 기호이다.)

- < 보 기 > —————
- ㄱ. A와 C는 같은 족 원소이다.
 ㄴ. x = 1이다.
 ㄷ. DB는 액체 상태에서 전기 전도성이 있다.
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음은 2주기 바닥상태 원자 X ~ Z에 대한 자료이다.

- X, Y, Z는 홀전자 수가 같다.
- 제1 이온화 에너지는 X가 가장 크다.
- 제2 이온화 에너지는 Z가 가장 크다.

전기 음성도를 옳게 비교한 것은? (단, X ~ Z는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

- ① X > Y > Z ② X > Z > Y ③ Y > Z > X
 ④ Z > X > Y ⑤ Z > Y > X


11. 표는 기체 (가), (나)에 대한 자료이다. (가)와 (나)는 분자량이 같다.

기체	분자식	질량(g)	A의 질량(g)	전체 원자 수
(가)	AB	x	12	$2N_A$
(나)	A_2C_4	28	24	y

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A ~ C는 임의의 원소 기호이고, N_A 는 아보가드로수이다.) [3점]

- < 보 기 > —————
- ㄱ. x = 14이다.
 ㄴ. y = $6N_A$ 이다.
 ㄷ. 원자량은 A > B이다.
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

12. 그림은 생명 현상과 관련 있는 물질 (가)~(다)의 구조식을 나타낸 것이다.




이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- < 보 기 >
- ㄱ. (가)에서 인(P)의 공유 전자쌍 수는 5이다.
 - ㄴ. (나)는 DNA 2중 나선 구조에서 (가)와 수소 결합한다.
 - ㄷ. (다)는 HCl(aq)과 반응할 때 루이스 염기로 작용한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림은 2, 3주기 원소 A~D의 이온 반지름을 나타낸 것이다. A^{2+} , B^{3+} , C^{2-} , D^- 은 18족 원소의 전자 배치를 갖는다.




A~D에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. A는 2주기 원소이다.
 - ㄴ. 원자 번호는 C가 B보다 크다.
 - ㄷ. 원자 반지름은 D가 B보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 3가지 분자를 주어진 기준에 따라 분류한 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- < 보 기 >
- ㄱ. (나)는 N_2H_4 이다.
 - ㄴ. (다)는 무극성 분자이다.
 - ㄷ. 결합각은 (다)가 (가)보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 표는 탄소 화합물 (가), (나)의 완전 연소 반응에 대한 자료이다. (나)는 실험식과 분자식이 같다.

탄소 화합물	분자식	연소시킨 질량(g)	반응한 O_2 의 질량(g)	생성물의 질량(g)	
				CO_2	H_2O
(가)	C_xH_y	a	$4w$	44	18
(나)	$C_xH_yO_z$	b	$3w$	44	18

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, H, C, O의 원자량은 각각 1, 12, 16이다.) [3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. (가)의 실험식은 CH_2 이다.
 - ㄴ. $b-a=w$ 이다.
 - ㄷ. (나)의 분자량은 $2b$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 표는 빛에너지를 방출하는 수소 원자의 전자 전이 (가)~(다)에 대한 자료이다.


전자 전이	(가)	(나)	(다)
전이 전 주양자수($n_{\text{전}}$)	2	x	y
전이 후 주양자수($n_{\text{후}}$)	1	2	z
방출하는 빛에너지(상댓값)	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{4}$

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 수소 원자의 에너지 준위 $E_n = -\frac{k}{n^2}$ 이다.) [3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 방출하는 빛의 파장은 (가)에서 (나)에서의 4배이다.
 - ㄴ. $x=y$ 이다.
 - ㄷ. (다)에서 방출하는 빛은 가시광선이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 다음은 기체 A와 B가 반응하여 기체 C를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더 (가), (나)에 A, B를 넣고 각각 반응을 완결시켰을 때, 반응 전과 후 기체에 대한 자료이다.

실린더	반응 전	반응 후
(가)	몰수 비 A : B = 1 : 1	몰수 비 B : C = 1 : 2
(나)	질량 비 A : B = 1 : 1	질량 비 B : C = 3 : 11

$\frac{B \text{의 분자량}}{A \text{의 분자량}}$ 는? [3점]

- ① $\frac{4}{7}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{7}{8}$ ④ $\frac{8}{7}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

18. 다음은 금속 A ~ C의 산화 환원 반응 실험이다.

[실험 과정]

(가) A^{a+}(aq)을 비커 I, II에 각각 V mL, 2V mL 넣는다.

(나) 비커 I에 B(s)와 C(s)를 N몰씩 넣어 반응을 완결시킨다.

(다) 비커 II에 B(s)와 C(s)를 N몰씩 넣어 반응을 완결시킨다.

[실험 결과]

- 과정 (나)에서 B(s)는 모두 반응하였다.
- 과정 (나), (다)에서 반응 후 수용액에 들어 있는 양이온의 종류와 몰수, 생성된 A(s)의 질량

과정	양이온의 종류	양이온의 몰수	생성된 A(s)의 질량(g)
(나)	B ³⁺ , C ²⁺	1.5N	x
(다)	A ^{a+} , B ³⁺ , C ²⁺	3.5N	y

$\frac{y}{x}$ 는? (단, 음이온은 반응하지 않으며, a는 3 이하의 자연수이다.) [3점]

- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 4

19. 표는 탄소 수가 4 이하인 사슬 모양 탄화수소 (가)~(라)에 대한 자료이다.

탄화수소	(가)	(나)	(다)	(라)
분자식	C _a H _n	C _a H _{n+2}	C _b H _{n+4}	C _b H _{n+6}
H 원자 1개가 결합된 C 원자 수	1	1	1	1

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

— < 보 기 > —

- ㄱ. (가)에는 2중 결합이 있다.
 ㄴ. (나)와 (다)는 실험식이 같다.
 ㄷ. H 원자 3개가 결합된 C 원자 수는 (라)가 (다)의 2배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

20. 표는 HCl(aq)과 NaOH(aq)의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가)~(다)에 대한 자료이다. X, Y는 각각 Na⁺, Cl⁻ 중 하나이다.

혼합 용액	혼합 전 용액의 부피(mL)		전체 이온 수	단위 부피당 이온 수(상댓값)	
	HCl(aq)	NaOH(aq)		X	Y
(가)	40	40	12N		1
(나)	20	60	12N	㉠	
(다)	20	10	a	2	㉡

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 용액의 부피의 합과 같다.) [3점]

— < 보 기 > —

- ㄱ. a = 3N이다.
 ㄴ. 생성된 물 분자 수 비는 (가):(다) = 4:1이다.
 ㄷ. ㉠:㉡ = 3:1이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

※ 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하십시오.