

공중보건

(A)

(1번~20번)

(9급)

1. 보건복지부에서 발표한 제3차 국민건강증진종합계획(Health Plan 2020)의 사업 분야 중 안전환경보건 분야의 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 순상예방
- ② 환경영향평가
- ③ 식품정책
- ④ 건강영향평가

2. 비례사망지수(proportional mortality indicator, PMI)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보건환경이 양호한 선진국에서는 비례사망지수가 높다.
- ② 연간 총 사망자 수에 대한 그 해 50세 이상의 사망자 수의 비율이다.
- ③ 국가간 보건수준을 비교하는 지표로 사용된다.
- ④ 비례사망지수가 높은 것은 평균수명이 낮은 것을 의미한다.

3. 물 속의 유기물질 등이 산화제에 의해 화학적으로 분해될 때 소비되는 산소량으로, 폐수나 유독물질이 포함된 공장폐수의 오염도를 알기 위해 사용하는 것은?

- ① 용존산소량(DO)
- ② 생물화학적 산소요구량(BOD)
- ③ 부유물질량(SS)
- ④ 화학적 산소요구량(COD)

4. Leavell과 Clark 교수의 질병예방 활동에서 40세 이상 여성을 대상으로 유방암 검진을 위한 유방조영술(mammography)을 시행한 것은 몇 차 예방인가?

- ① 일차예방
- ② 이차예방
- ③ 삼차예방
- ④ 사차예방

5. 다음 중 영아사망과 신생아사망 지표에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 영아후기사망은 선천적인 문제로, 예방이 불가능하다.
- ② 영아사망률과 신생아사망률은 저개발국가일수록 차이가 적다.
- ③ α -index가 1에 가까울수록 영유아 보건 수준이 낮음을 의미한다.
- ④ 영아사망은 보건관리를 통해 예방 가능하며 영아사망률은 각 국가 보건수준의 대표적 지표이다.

6. 인구집단을 대상으로 건강관련 문제를 연구하기 위한 단면 연구(cross-sectional study)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 병원 또는 임상시험 연구기관 등에서 새로운 치료제나 중재 방법의 효과를 검증하는 방법이다.
- ② 장기간 관찰로 추적이 불가능한 대상자가 많아지면 연구를 실패할 가능성이 있다.
- ③ 코호트연구(cohort study)에 비하여 시간과 경비가 절감되어 효율적이다.
- ④ 적합한 대조군의 선정이 어렵다.

7. 보건교육 방법 중 참가자가 많을 때 여러 개 분단으로 나누어 토의한 후 다시 전체 회의를 통해 종합하는 방법으로 진행하는 것은?

- ① 집단토의(group discussion)
- ② 패널토의(panel discussion)
- ③ 버즈세션(buzz session)
- ④ 심포지엄(symposium)

8. 「학교보건법 시행령」상 보건교사의 직무내용으로 보기 어려운 것은?

- ① 학교보건계획의 수립
- ② 학교 환경위생의 유지, 관리 및 개선에 관한 사항
- ③ 학교 및 교직원의 건강진단과 건강평가
- ④ 각종 질병의 예방처치 및 보건지도

9. 강도율에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 산업재해의 경증을 알기 위해 사용
- ② 근로시간 1,000시간당 발생한 근로손실일수
- ③ 인적 요인보다는 환경적 요인으로 발생되는 재해를 측정
- ④ 근로손실일수를 계산할 때, 사망 및 영구 전노동불능은 7,500일로 계산

10. 정수방법 중 여과법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 완속여과의 여과속도는 3m/day이고, 급속여과의 여과 속도는 120m/day 정도이다.
- ② 급속여과의 생물막 제거법은 사면교체이고, 완속여과의 생물막 제거법은 역류세척이다.
- ③ 원수의 탁도·색도가 높을 때는 완속여과가 효과적이다.
- ④ 완속여과에 비해 급속여과의 경상비가 적게 든다.

11. 당뇨환자를 발견하기 위한 집단검진으로 공복 시 혈당 검사를 하려고 한다. 검사의 정확도(Validity)를 높이기 위하여 혈당측정 검사도구가 갖추어야 할 조건은?

- ① 높은 감수성(susceptibility)
- ② 높은 민감도(sensitivity)
- ③ 낮은 양성예측도(positive predictive value)
- ④ 낮은 특이도(specificity)

12. 사회보험과 민간보험을 비교한 것이다. ㉠~㉢을 올바른 내용으로 나열한 것은?

구분	민간보험	사회보험
목적	개인적 필요에 따른 보장	기본적 수준 보장
가입방식	㉠	㉡
수급권	㉡	㉢
보험료 부담방식	주로 정액제	주로 정률제

㉠ ㉡ ㉢

- ① 임의가입 강제가입 법적 수급권 계약적 수급권
- ② 임의가입 강제가입 계약적 수급권 법적 수급권
- ③ 강제가입 임의가입 계약적 수급권 법적 수급권
- ④ 강제가입 임의가입 법적 수급권 계약적 수급권

13. 「지역보건법」상 보건소의 기능 및 업무 중 지역주민의 건강 증진과 질병예방·관리를 위한 지역보건의료서비스 제공에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 감염병의 예방 및 관리
- ② 모성과 영유아의 건강유지·증진
- ③ 건강보험에 관한 사항
- ④ 정신건강증진 및 생명존중에 관한 사항

14. 국민의료비에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 보건의료와 관련하여, 소비하고 투자한 총 지출을 의미한다.
- ② 국제비교를 위하여 직접 조사를 통해 얻어지는 수치이다.
- ③ 의료비 지출이 증가하면 후생수준도 반드시 높아진다.
- ④ 국민의료비를 산출할 때, 개인의료비는 제외된다.

15. 다음과 같은 인구구조를 가진 지역사회의 노년부양비는?

연령별 인구수

- | | |
|-----------------|-----------------|
| • 0~14세 : 300명 | • 15~44세 : 600명 |
| • 45~64세 : 400명 | • 65~74세 : 90명 |
| • 75세 이상 : 30명 | |

- ① 20.0%
- ② 13.3%
- ③ 12.0%
- ④ 9.23%

16. 근로자에 대한 건강진단 결과의 건강관리구분 판정기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A : 정상자
- ② R : 질환의심자
- ③ D1 : 직업병 유소견자
- ④ C2 : 직업병 요관찰자

17. 「학교보건법 시행규칙」상 교실 내 환경요건에 적합하지 않은 것은?

- ① 조도 - 책상면 기준으로 200Lux
- ② 1인당 환기량 - 시간당 25m³
- ③ 습도 - 비교습도 50%
- ④ 온도 - 난방온도 섭씨 20도

18. 다음 중 식중독을 일으키는 식품과 원인물질이 맞게 짹어진 것은?

- ① 고사리 - 아미그달린
- ② 청매 - 솔라닌
- ③ 목화 - 프타퀴로시드
- ④ 독미나리 - 시쿠톡신

19. 다음 중 감마 글로불린(γ -globulin) 또는 항독소(antitoxin) 등의 인공체제를 주입하여 생긴 면역은?

- ① 인공피동면역(artificial passive immunity)
- ② 인공능동면역(artificial active immunity)
- ③ 자연피동면역(natural passive immunity)
- ④ 자연능동면역(natural active immunity)

20. 보건소의 지리적 접근도가 낮아 주민들의 보건소 이용률이 감소하였다. 중앙정부의 재정적 지원으로 보건지소를 설치하여 취약지역 주민에 대한 보건서비스를 강화하였다면 이는 SWOT분석에서 무슨 전략인가?

- ① SO전략(strength-opportunity strategy)
- ② WO전략(weakness-opportunity strategy)
- ③ ST전략(strength-threat strategy)
- ④ WT전략(weakness-threat strategy)