

## 2019학년도 대학수학능력시험 문제 및 정답

- 매교시 종료 후 탑재됩니다.(중증시각장애 수험생 시험시간 기준)
- 모든 문제 및 정답은 PDF파일로 되어 있습니다.(단, 듣기 파일은 MP3파일)
- 탑재된 파일은 수험생에게 제공된 문제지와 다르게 보일 수도 있습니다.

### 저작권 안내

이 문제지에 관한 저작권은 한국교육과정평가원에 있습니다.  
한국교육과정평가원의 허락없이 문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, 출판,  
전자출판 하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.




제 4 교시

과학탐구 영역(생명 과학 I)

|    |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 성명 |  | 수험 번호 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|

1. 그림은 동물 세포의 구조를 나타낸 것이다. A~C는 각각 골지체, 리소좀, 소포체 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. A는 소포체이다.  
 ㄴ. B는 식물 세포에도 존재한다.  
 ㄷ. C는 세포 내 소화를 담당한다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 표 (가)는 식물에 있는 물질 A~C에서 특징 ㉠~㉣의 유무를 나타낸 것이고, (나)는 ㉠~㉣을 순서 없이 나타낸 것이다. A~C는 단백질, 셀룰로스, DNA를 순서 없이 나타낸 것이다.

| 특징 | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|----|---|---|---|
| A  | ? | ○ | × |
| B  | × | ? | ○ |
| C  | ? | ? | ? |

(○: 있음, ×: 없음)

(가)

| 특징(㉠~㉣)          |
|------------------|
| • 탄소 화합물이다.      |
| • 염색체의 구성 성분이다.  |
| • 펩타이드 결합이 존재한다. |

(나)


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>


ㄱ. ㉠은 ‘펩타이드 결합이 존재한다.’이다.  
 ㄴ. A의 기본 단위는 뉴클레오타이드이다.  
 ㄷ. B는 탄수화물에 속한다.

- ① ㄱ      ② ㄷ      ③ ㄱ, ㄴ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그림 (가)는 광합성과 세포 호흡에서의 에너지와 물질의 이동, (나)는 ATP와 ADP 사이의 전환을 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡는 각각 광합성과 세포 호흡 중 하나이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ㉠에서 빛에너지가 화학 에너지로 전환된다.  
 ㄴ. ㉠ 과정에서 ATP에 저장된 에너지가 방출된다.  
 ㄷ. ㉡에서 ㉠ 과정이 일어난다.

- ① ㄱ      ② ㄷ      ③ ㄱ, ㄴ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 표는 식물의 구성 단계의 일부와 예를 나타낸 것이다. I~III은 각각 기관, 조직, 조직계 중 하나이다.

| 구성 단계 | 예      |
|-------|--------|
| I     | ㉠ 잎    |
| II    | 기본 조직계 |
| III   | ㉡ 형성층  |


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. ㉠에는 관다발 조직계가 있다.  
 ㄴ. 체관은 II의 예에 해당한다.  
 ㄷ. ㉡는 분열 조직이다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 같은 종인 동물( $2n=6$ ) I과 II의 세포 (가)~(라) 각각에 들어 있는 모든 염색체를 나타낸 것이다. (가)~(라) 중 1 개만 I의 세포이며, 나머지는 II의  $G_1$ 기 세포로부터 생식 세포가 형성되는 과정에서 나타나는 세포이다. 이 동물의 성염색체는 암컷이 XX, 수컷이 XY이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이는 고려하지 않는다.)

<보 기>

ㄱ. (가)는 세포 주기의 S기를 거쳐 (라)가 된다.  
 ㄴ. (나)와 (라)의 핵상은 같다.  
 ㄷ. (다)는 II의 세포이다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄷ      ④ ㄱ, ㄴ      ⑤ ㄴ, ㄷ

6. 표는 사람의 몸을 구성하는 기관의 특징을 나타낸 것이다. A와 B는 간과 이자를 순서 없이 나타낸 것이다.

| 기관 | 특징              |
|----|-----------------|
| A  | 암모니아가 요소로 전환된다. |
| B  | ㉠ 글루카곤이 분비된다.   |
| 소장 | (가)             |

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. ㉠은 A에서 글리코젠 분해를 촉진한다.  
 ㄴ. B의  $\beta$  세포에서 인슐린이 분비된다.  
 ㄷ. ‘아미노산이 흡수된다.’는 (가)에 해당한다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 표는 사람의 질병을 A와 B로 구분하여 나타낸 것이다. A와 B는 각각 감염성 질병과 비감염성 질병 중 하나이다.

| 구분 | 질병                                 |
|----|------------------------------------|
| A  | ㉠ 후천성 면역 결핍 증후군(AIDS),<br>㉡ 독감, 결핵 |
| B  | 낮 모양 적혈구 빈혈증                       |


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>


- ㄱ. ㉠의 병원체는 세포 구조로 되어 있다.  
 ㄴ. ㉡의 병원체는 스스로 물질대사를 하지 못한다.  
 ㄷ. 혈우병은 B의 예에 해당한다.

- ① ㄱ      ② ㄷ      ③ ㄱ, ㄴ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림 (가)는 어떤 동물( $2n=4$ )의 체세포 Q를 배양한 후 세포당 DNA 양에 따른 세포 수를, (나)는 Q의 체세포 분열 과정 중 ㉠ 시기에서 관찰되는 세포를 나타낸 것이다. 이 동물의 특정 형질에 대한 유전자형은 Rr이며, R와 r는 대립 유전자이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. 구간 I에는 간기의 세포가 있다.  
 ㄴ. 구간 II에는 ㉠ 시기의 세포가 있다.  
 ㄷ. a에는 대립 유전자 R가 있다.


- ① ㄱ      ② ㄷ      ③ ㄱ, ㄴ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 다음은 골격근의 수축 과정에 대한 자료이다.

- 표는 골격근 수축 과정의 세 시점  $t_1 \sim t_3$ 일 때 근육 원섬유 마디 X의 길이, ㉠의 길이에서 ㉡의 길이를 뺀 값(㉠-㉡), ㉢의 길이를, 그림은  $t_3$ 일 때 X의 구조를 나타낸 것이다. X는 좌우 대칭이다.

| 시점    | X의 길이 | ㉠-㉡ | ㉢의 길이 |
|-------|-------|-----|-------|
| $t_1$ | 3.2   | 0.4 | ?     |
| $t_2$ | ?     | 1.0 | 0.5   |
| $t_3$ | ?     | ?   | 0.3   |

(단위:  $\mu\text{m}$ )



- 구간 ㉠은 마이오신 필라멘트가 있는 부분이고, ㉡은 마이오신 필라멘트만 있는 부분이며, ㉢은 액틴 필라멘트만 있는 부분이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ.  $t_1$ 에서  $t_2$ 로 될 때 액틴 필라멘트의 길이는 짧아진다.  
 ㄴ. X의 길이는  $t_2$ 일 때가  $t_3$ 일 때보다  $0.4 \mu\text{m}$  길다.  
 ㄷ.  $t_1$ 일 때  $\frac{\text{㉠의 길이} + \text{㉢의 길이}}{\text{㉠의 길이} + \text{㉡의 길이}}$ 는  $\frac{6}{7}$ 이다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄷ      ④ ㄱ, ㄴ      ⑤ ㄴ, ㄷ

10. 다음은 병원성 세균 A에 대한 백신을 개발하기 위한 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

- (가) A로부터 두 종류의 물질 ㉠과 ㉡을 얻는다.  
 (나) 유전적으로 동일하고 A, ㉠, ㉡에 노출된 적이 없는 생쥐 I~V를 준비한다.  
 (다) 표와 같이 주사액을 I~III에게 주사하고 일정 시간이 지난 후, 생쥐의 생존 여부와 A에 대한 항체 생성 여부를 확인한다.

| 생쥐  | 주사액의 조성 | 생존 여부 | 항체 생성 여부 |
|-----|---------|-------|----------|
| I   | 물질 ㉠    | 산다    | ?        |
| II  | 물질 ㉡    | 산다    | 생성됨      |
| III | 세균 A    | 죽는다   | ?        |

- (라) 2주 후 (다)의 I에서 혈청 ㉢을, II에서 혈청 ㉣을 얻는다.  
 (마) 표와 같이 주사액을 IV와 V에게 주사하고 1일 후 생쥐의 생존 여부를 확인한다.

| 생쥐 | 주사액의 조성     | 생존 여부 |
|----|-------------|-------|
| IV | 혈청 ㉢ + 세균 A | 죽는다   |
| V  | 혈청 ㉣ + 세균 A | 산다    |

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉢에는 형질 세포가 들어 있다.  
 ㄴ. (다)의 II에서 체액성 면역 반응이 일어났다.  
 ㄷ. (마)의 V에서 A에 대한 2차 면역 반응이 일어났다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄷ      ④ ㄱ, ㄷ      ⑤ ㄴ, ㄷ

11. 다음은 어떤 식물의 유전 형질 ㉠~㉣에 대한 자료이다.

- ㉠은 대립 유전자 A와 a에 의해, ㉡은 대립 유전자 B와 b에 의해, ㉢은 대립 유전자 D와 d에 의해, ㉣은 대립 유전자 E와 e에 의해 결정된다.  
 ○ ㉠~㉣ 중 3가지 형질은 각 유전자형에서 대문자로 표시되는 대립 유전자가 소문자로 표시되는 대립 유전자에 대해 완전 우성이다. ㉣ 나머지 한 형질을 결정하는 대립 유전자 사이의 우열 관계는 분명하지 않고, 3가지 유전자형에 따른 표현형이 모두 다르다.  
 ○ 유전자형이 ㉤  $AaBbDdEe$ 인 개체를 자가 교배하여 얻은 자손( $F_1$ ) 3200 개체의 표현형은 18가지이다.  
 ○ 유전자형이  $AABbddEe$ 인 개체와  $AaBbDDee$ 인 개체를 교배하여 얻은 자손( $F_1$ ) 3200 개체의 표현형은 3가지이며, 이 개체들에서 유전자형이 ㉥  $AabbDdEe$ 인 개체가 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.) [3점]


<보 기>

- ㄱ. ㉣은 ㉥이다.  
 ㄴ. ㉤에서 B와 e는 연관되어 있다.  
 ㄷ. ㉤과 ㉥을 교배하여 자손( $F_1$ )을 얻을 때, 이 자손의 표현형이 ㉣과 같을 확률은  $\frac{3}{16}$ 이다.

- ① ㄱ      ② ㄷ      ③ ㄱ, ㄴ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 중추 신경계로부터 자율 신경을 통해 위와 방광에 연결된 경로를 나타낸 것이다.


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



- <보 기>
- ㄱ. ㉠은 말초 신경계에 속한다.  
 ㄴ. ㉠과 ㉡의 말단에서 분비되는 신경 전달 물질은 같다.  
 ㄷ. ㉢의 신경 세포체는 연수에 존재한다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 어떤 동물 종( $2n = 6$ )의 유전 형질 ①은 2쌍의 대립 유전자 H와 h, T와 t에 의해 결정된다. 그림은 이 동물 종의 세포 (가)~(라)가 갖는 유전자 ㉠~㉣의 DNA 상대량을 나타낸 것이다. 이 동물 종의 개체 I에서는 ㉠~㉣의 DNA 상대량이 (가), (나), (다)와 같은 세포가, 개체 II에서는 ㉠~㉣의 DNA 상대량이 (나), (다), (라)와 같은 세포가 형성된다. ㉠~㉣은 H, h, T, t를 순서 없이 나타낸 것이다. 이 동물 종의 성염색체는 암컷이 XX, 수컷이 XY이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, (가)와 (다)는 중기의 세포이다. H, h, T, t 각각의 1개당 DNA 상대량은 같다.) [3점]

- <보 기>
- ㄱ. ㉠은 ㉢과 대립 유전자이다.  
 ㄴ. (가)와 (다)의 염색 분체 수는 같다.  
 ㄷ. 세포 1개당  $\frac{X \text{ 염색체 수}}{\text{상염색체 수}}$ 는 (라)가 (나)의 2배이다.

- ① ㄱ      ② ㄷ      ③ ㄱ, ㄴ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 생태계를 구성하는 요소 사이의 상호 관계를 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]




- <보 기>
- ㄱ. 생태적 지위가 중복되는 여러 종의 새가 서식지를 나누어 사는 것은 ㉠에 해당한다.  
 ㄴ. 위도에 따라 식물 군집의 분포가 달라지는 현상은 ㉡에 해당한다.  
 ㄷ. 곰팡이는 생물 군집에 속한다.


- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음은 민말이집 신경 A~C의 흥분 전도에 대한 자료이다.

○ 그림은 A~C의 지점  $d_1$ 으로부터 세 지점  $d_2 \sim d_4$ 까지의 거리를, 표는 ㉠ 각 신경의  $d_1$ 에 역치 이상의 자극을 동시에 1회 주고 경과된 시간이 3ms일 때  $d_1 \sim d_4$ 에서 측정된 막전위를 나타낸 것이다. I~III은 A~C를 순서 없이 나타낸 것이다.



○ A의 흥분 전도 속도는 2cm/ms이다.  
 ○ 그림 (가)는 A와 B의  $d_1 \sim d_4$ 에서, (나)는 C의  $d_1 \sim d_4$ 에서 활동 전위가 발생하였을 때 각 지점에서의 막전위 변화를 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C에서 흥분의 전도는 각각 1회 일어났고, 휴지 전위는 -70mV이다.) [3점]

- <보 기>
- ㄱ. 흥분의 전도 속도는 C에서가 A에서보다 빠르다.  
 ㄴ. ㉠이 3ms일 때 I의  $d_2$ 에서  $K^+$ 은  $K^+$  통로를 통해 세포 밖으로 확산된다.  
 ㄷ. ㉠이 5ms일 때 B의  $d_4$ 와 C의  $d_4$ 에서 측정된 막전위는 같다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음은 어떤 식물의 종자 껍질 색 유전에 대한 자료이다.

○ 종자 껍질 색은 2쌍의 대립 유전자 A와 a, B와 b에 의해 결정되며, A는 a에 대해, B는 b에 대해 각각 완전 우성이다.  
 ○ 표 (가)는 A, a, B, b의 특성을, (나)는 색소 합성 여부에 따른 종자 껍질 색을 나타낸 것이다.

| 대립 유전자 | 특성             | 색소 합성 여부 | 종자 껍질 색 |
|--------|----------------|----------|---------|
| A      | 검은색 색소가 합성됨    | ○        | 검은색     |
| a      | 검은색 색소가 합성 안 됨 | ○        | 검은색     |
| B      | 회색 색소가 합성됨     | ×        | 회색      |
| b      | 회색 색소가 합성 안 됨  | ×        | 회색      |

(가) (나)


○ 종자 껍질 색이 검은색인 개체 P를 자가 교배하여 자손( $F_1$ ) 1600 개체를 얻었다. 이 자손의 표현형에 따른 비는 ㉠ 검은색 : ㉡ 회색 : ㉢ 흰색 = 12 : 3 : 1이다.

$F_1$ 에서 ㉠의 개체와 ㉡의 개체를 교배하여 자손( $F_2$ )을 얻을 때, 이 자손의 종자 껍질 색이 검은색일 확률은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.)

- ①  $\frac{7}{8}$       ②  $\frac{2}{3}$       ③  $\frac{9}{16}$       ④  $\frac{1}{2}$       ⑤  $\frac{3}{8}$

17. 다음은 어떤 집안의 유전 형질 ㉠과 ㉡에 대한 자료이다.

- ㉠은 대립 유전자 A와 A\*에 의해, ㉡은 대립 유전자 B와 B\*에 의해 결정된다. A는 A\*에 대해, B는 B\*에 대해 각각 완전 우성이다.
- ㉠의 유전자와 ㉡의 유전자는 연관되어 있다.
- 가계도는 구성원 1~8에게서 ㉠과 ㉡의 발현 여부를 나타낸 것이다.



- 1~8의 핵형은 모두 정상이다.
- 5와 8 중 한 명은 정상 난자와 정상 정자가 수정되어 태어났다. 나머지 한 명은 염색체 수가 비정상적인 난자와 염색체 수가 비정상적인 정자가 수정되어 태어났으며, ㉠이 난자와 정자의 형성 과정에서 각각 염색체 비분리가 1회 일어났다.
- $\frac{1, 2, 6 \text{ 각각의 체세포 1개당 A*의 DNA 상대량을 더한 값}}{3, 4, 7 \text{ 각각의 체세포 1개당 A*의 DNA 상대량을 더한 값}} = 1$ 이다.


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 염색체 비분리 이외의 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A와 A\* 각각의 1개당 DNA 상대량은 1이다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 우성 형질이다.
- ㄴ. ㉠의 형성 과정에서 염색체 비분리는 감수 2분열에서 일어났다.
- ㄷ. 6과 7 사이에서 아이가 태어날 때, 이 아이에게서 ㉠과 ㉡ 중 ㉠만 발현될 확률은  $\frac{1}{4}$ 이다.

① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄷ      ④ ㄱ, ㄴ      ⑤ ㄴ, ㄷ

18. 그림은 영양 염류가 유입된 호수의 식물성 플랑크톤 군집에서 전체 개체수, 종 수, 종 다양성과 영양 염류 농도를 시간에 따라 나타낸 것이며, 표는 종 다양성에 대한 자료이다.



- 종 다양성은 종 수가 많을수록 높아진다.
- 종 다양성은 전체 개체수에서 각 종이 차지하는 비율이 균등할수록 높아진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 식물성 플랑크톤 군집은 여러 종의 식물성 플랑크톤으로만 구성되며, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.)

<보 기>

- ㄱ. 구간 I에서 개체수가 증가하는 종이 있다.
- ㄴ. 전체 개체수에서 각 종이 차지하는 비율은 구간 I에서 구간 II에서보다 균등하다.
- ㄷ. 종 다양성은 동일한 생물 종이라도 형질이 각 개체 간에 다르게 나타나는 것을 의미한다.

① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄷ      ④ ㄱ, ㄴ      ⑤ ㄱ, ㄷ

19. 다음은 어떤 집안의 ABO식 혈액형과 유전 형질 (가)에 대한 자료이다.

- (가)는 대립 유전자 T와 T\*에 의해 결정되며, T는 T\*에 대해 완전 우성이다. (가)의 유전자는 ABO식 혈액형 유전자와 연관되어 있다.
- 표는 구성원의 성별, ABO식 혈액형과 (가)의 발현 여부를 나타낸 것이다. ㉠, ㉡, ㉢은 ABO식 혈액형 중 하나이며, ㉠, ㉡, ㉢은 각각 서로 다르다.

| 구성원  | 성별 | 혈액형 | (가) |
|------|----|-----|-----|
| 아버지  | 남  | ㉠   | ×   |
| 어머니  | 여  | ㉡   | ×   |
| 자녀 1 | 남  | ㉠   | ×   |
| 자녀 2 | 여  | ㉢   | ○   |
| 자녀 3 | 여  | ㉡   | ×   |

(○: 발현됨, ×: 발현 안 됨)

- 자녀 1의 (가)에 대한 유전자형은 동형 접합이다.
- 자녀 3과 혈액형이 O형이면서 (가)가 발현되지 않은 남자 사이에서 ㉠A형이면서 (가)가 발현된 남자 아이가 태어났다.


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.)

<보 기>

- ㄱ. ㉡은 A형이다.
- ㄴ. 아버지와 자녀 1의 ABO식 혈액형에 대한 유전자형은 서로 다르다.
- ㄷ. ㉠의 동생이 태어날 때, 이 아이의 혈액형이 A형이면서 (가)가 발현되지 않을 확률은  $\frac{1}{4}$ 이다.

① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄷ      ④ ㄱ, ㄴ      ⑤ ㄴ, ㄷ

20. 그림 (가)는 어떤 지역의 식물 군집 K에서 산불이 난 후의 천이 과정을, (나)는 K의 시간에 따른 총생산량과 순생산량을 나타낸 것이다. A와 B는 양수림과 음수림을 순서 없이 나타낸 것이다.



(가)

(나)

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. (가)는 2차 천이를 나타낸 것이다.
- ㄴ. K는 (가)의 A에서 극상을 이룬다.
- ㄷ. (나)에서  $t_1$ 일 때 K의 생산량은 순생산량보다 크다.

① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

\* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.